

気管支喘息

- ① 今までに、咳込みが持続したり、ゼーゼーやヒューヒューしたことがありますか？ はい いいえ
- ② はじめて、ゼーゼーやヒューヒューが出たのは、何歳頃ですか？ _____ 歳 _____ ヶ月頃
- ③ 医師から、気管支喘息と診断を受けたことはありますか？
 いいえ はい : 何歳の時ですか？ _____ 歳 _____ ヶ月頃
- ④ 気管支喘息で入院したことはありますか？ いいえ はい (何回入院しましたか？ _____ 回)
- ⑤ どのくらいの頻度で、咳込み・ゼーゼー・ヒューヒューしていました(しています)か？
 ほぼ毎日 週に数回 1 ヶ月に数回 2~3 ヶ月に1回程度 年に数回程度(季節の変わり目など)
- ⑥ どんな時に、ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが多いですか？
 寝始めの時 寝入ってから(夜中) 朝起きる前 朝起きてから 日中 運動時 風邪の時
 大声で笑ったり、はしゃいだりした時 ホコリっぽいところに行ったとき 動物に接したとき 煙など吸ったとき
- ⑦ どんな時期に、ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが多いですか？
 春 夏 秋 冬 季節の変わり目 雨の日 台風 天候が荒れるとき
 精神的なもの(具体的に: _____)
 その他 (具体的に: _____)
- ⑧ 今まで定期的な(毎日)治療をされてきましたか？(ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが無いときもお薬を使用しましたか？)
 定期的な治療は行わず、ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが起きたら治療していた。
 定期的な治療をおこなっていた (_____ 歳 _____ ヶ月頃から) → 今も治療している 今は行っていない
- 使用した(している)内服薬 ソグリア キプロ オノ アピディ プラカスト
 テドール エフィル ベネツ ベラチ マチ リカール ビバント
- 使用した(している)吸入薬 カムイ アドイ キョバル パルミコート シビコート カバノ
 ヴバント イタル マチ その他 (_____)
- その他 (_____)
- 吸入器はお持ちですか？ いいえ はい (メーカー: _____ 型番: _____)
- ⑨ ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが出たときはどんなことをしていますか？
 薬を追加する
- 使用する内服薬 (_____)
- 使用する吸入薬 (_____)
- その他 (_____)
- 安静にする 水分をとる 腹式呼吸をする その他 (_____)
- ⑩ その他、相談したいことなどございましたらご記入ください。

