

# 気管支喘息

- ① 今までに、咳込みが持続したり、ゼーゼーやヒューヒューしたことがありますか？ はい いいえ
- ② はじめて、ゼーゼーやヒューヒューが出たのは、何歳頃ですか？ \_\_\_\_\_歳 \_\_\_\_\_ヶ月頃
- ③ 医師から、気管支喘息と診断を受けたことはありますか？  
いいえ はい : 何歳の時ですか？ \_\_\_\_\_歳 \_\_\_\_\_ヶ月頃
- ④ 気管支喘息で入院したことはありますか？ いいえ はい (今までに何回入院しましたか？ \_\_\_\_\_回)
- ⑤ どのくらいの頻度で、咳込み・ゼーゼー・ヒューヒューしていました(しています)か？  
ほぼ毎日 週に数回 1ヶ月に数回 2~3ヶ月に1回程度 年に数回程度(季節の変わり目など)
- ⑥ どんな時に、ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが多いですか？  
寝始めの時 寝入ってから(夜中) 朝起きる前 朝起きてから 日中 運動時 風邪の時  
大声で笑ったり、はしゃいだりした時 ホコリっぽいところに行ったとき 動物に接したとき 煙など吸ったとき
- ⑦ どんな時期に、ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが多いですか？  
春 夏 秋 冬 季節の変わり目 雨の日 台風 天候が荒れるとき  
精神的なもの(具体的に: \_\_\_\_\_)  
その他(具体的に: \_\_\_\_\_)
- ⑧ 今まで定期的な(毎日)治療をされてきましたか？(ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが無いときもお薬を使用しましたか?)  
定期的な治療は行わず、ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが起きたら治療していた。  
定期的な治療をおこなっていた( \_\_\_\_\_歳 \_\_\_\_\_ヶ月頃から) → 今も治療している 今は行っていない
- 使用した(している)内服薬 ソグリア キリ オカ アピディ ラカスト メンカスト  
テドール エフィル ベネツ ベラチ メチ ブリアニル セバニト
- 使用した(している)吸入薬 カムイ アドエア キバール パルミコート シビコート カバノ  
セバニト インタル メチ その他( \_\_\_\_\_)
- その他( \_\_\_\_\_)
- 吸入器はお持ちですか？ いいえ はい (メーカー: \_\_\_\_\_)
- ⑨ ゼーゼー・ヒューヒュー・咳込みが出たときはどんなことをしていますか？  
薬を追加する
- 使用する内服薬( \_\_\_\_\_)
- 使用する吸入薬( \_\_\_\_\_)
- その他( \_\_\_\_\_)
- 安静にする 水分をとる 腹式呼吸をする その他( \_\_\_\_\_)
- ⑩ その他、相談したいことなどございましたらご記入ください。

